



OEA | CICAD

SATA e-Newsletter Vol.25

Febrero, 2026

SATA

El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) gestiona y coordina el Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA) en el marco de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020 y su Plan de Acción 2021-2025, en proceso de actualización para el período 2026-2030.

El SATA funciona como centro de intercambio de información y plataforma de difusión sobre drogas emergentes y se nutre de las alertas emitidas por los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) nacionales. También fomenta la cooperación internacional y horizontal en la vigilancia de las nuevas drogas y los esfuerzos de respuesta.

Para más información sobre drogas nuevas y emergentes en las Américas, visite:

<https://www.oas.org/ext/es/seguridad/sistema-alerta-temprana>

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE DROGAS (OID)

<https://www.oas.org/ext/en/main/oas/our-structure/gs/sms/cicad/interamerican-observatory-drugs>

SATA

Sistema de Alerta Temprana de las Américas

Resumen de Alertas e Información Relacionada con Drogas Emergentes recibidas en enero de 2026

1. **NUEVOS ADULTERANTES**
2. **MDMA**
3. **FENTANILO**
4. **SÍNDROME DE HIPERÉMESIS CANNABINOIDE**
5. **METADONA**
6. **VAPEADORES CON THC**
7. **BUPRENORFINA**
8. **MDMA**
9. **N-ETILPENTILONA**
10. **POLICONSUMO**

PRINCIPALES HALLAZGOS

Información desde los SAT Nacionales en la Región

En Argentina, el SAT nacional notificó dos eventos. El primero correspondió a la detección de la catinona sintética N-etilpentilona, en comprimidos incautados en Córdoba, identificada junto con MDMA y MDA, asociada a entornos universitarios y comercialización engañosa como éxtasis, sustancialmente aumentando los riesgos de intoxicaciones graves y muertes.

El segundo evento, registrado en Mendoza, reveló un patrón de policonsumo extremo en muestras biológicas, con presencia simultánea de estimulantes (cocaína, metcatinona, N-metil-2-aminoindano), depresores y medicamentos regulados (incluyendo metilfenidato, gabapentina), además de metabolitos asociados. Ambos hallazgos evidencian la expansión de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y patrones complejos de consumo en Argentina, con serios riesgos cardiovasculares, neurológicos y psiquiátricos, lo que subraya la necesidad del fortalecimiento de la cooperación internacional, el monitoreo intensivo y campañas preventivas para reducir el impacto sanitario y social.

En Canadá, el Centro Canadiense de Lucha contra el Abuso de Sustancias (CCSA, por sus siglas en inglés) alertó en enero de 2026 sobre un incremento marcado en urgencias por Síndrome de Hiperémesis por Cannabis (SHC) asociado a productos con alto contenido de Tetrahidrocannabinoides (THC).

En los Estados Unidos, entre 2023 y 2025, el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre Drogas (NDEWS, por sus siglas en inglés) reportó 2.510 sobredosis no fatales por

buprenorfina y 10.040 intervenciones de los servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) asociados a la metadona, además de una disminución reciente en los eventos por fentanilo, con patrones concentrados en estados del sur y noreste. Actualmente, el monitoreo web identificó aumentos en el uso no prescrito de buprenorfina y metadona, incluido el consumo recreativo y el policonsumo, mientras que la actividad relacionada con el fentanilo descendió. Aunque estas sustancias poseen usos clínicos establecidos, su empleo sin supervisión incrementa riesgos de toxicidad, hipoxia y sobredosis, especialmente ante la presencia de adulterantes emergentes y cambios rápidos en el suministro ilícito, lo que refuerza la necesidad de vigilancia y estrategias de reducción de daños.

En Guyana, el SAT de la Unidad Antinarcótics Aduanera (CANU, por sus siglas en inglés), confirmó la presencia de tabletas con 3,4-metilenedioximetanfetamina (MDMA) y cartuchos de vapeo con extracto de THC, tras incautaciones en Lethem y Georgetown, evidenciando su circulación en zonas de entretenimiento y su vínculo con el microtráfico juvenil. Los hallazgos indican una distribución activa de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) y vapeadores ilícitos dirigidos a los jóvenes, cuyo contenido puede incluir adulterantes y compuestos de alta potencia. Las autoridades advirtieron riesgos asociados con sobredosis, daños pulmonares y efectos psicológicos severos, como ansiedad, paranoia y convulsiones, enfatizando la necesidad de mayor vigilancia y acciones preventivas interinstitucionales.

1. Estados Unidos (30 de enero, 2026) – Alerta sobre la Presencia de Nuevos Adulterantes y Variaciones en las Sobredosis Reportadas

El Informe Semanal del NDEWS destacó las observaciones de los Directores de Sitios Centinela (SSD, por sus siglas en inglés) sobre tendencias de 2025 relacionadas con la presencia de nuevos adulterantes y variaciones en las sobredosis reportadas. Notablemente, varios sitios reportaron transformaciones en el suministro local, incluyendo la aparición de medetomidina como adulterante emergente, un fenómeno identificado por tres directores y coherente con los cambios rápidos que caracterizan el mercado de opioides sintéticos. Estas observaciones se complementan con el lanzamiento del informe actualizado sobre predicciones de sobredosis no fatales por fentanilo, cuya referencia se corrigió en esta edición del boletín. Por su parte, la Red Comunitaria de Respuesta a Sobredosis (COR, por sus siglas en inglés) ofreció una vista comprensiva basada en 57 organizaciones presentes en 29 estados, con reportes que abarcan desde el otoño de 2025. Las organizaciones describieron variaciones rápidas en el suministro, una mezcla creciente de adulterantes y un aumento en la demanda de servicios, incluyendo pruebas de drogas: el 44% de los grupos ofreció algún tipo de revisión de drogas, siendo más comunes las tiras reactivas y el análisis presencial de Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés). Aunque los patrones difieren por región, las respuestas coinciden en señalar una mayor inestabilidad del mercado y en subrayar la importancia de contar con sistemas locales capaces de identificar señales tempranas de riesgo.

Los datos complementarios incluidos en el informe reforzaron estas observaciones: estudios clínicos recientes muestran la persistencia de sedantes como xilacina, con un 23% de exposición confirmada entre pacientes con sobredosis, mientras que los análisis forenses de 2025 reportaron un aumento en opioides sintéticos de la familia de los nitacenos y una presencia creciente de sedantes como la medetomidina. A la par, alertas nacionales señalaron un incremento sostenido en el uso de estimulantes, especialmente de metanfetamina. En conjunto, estos hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer mecanismos ágiles de vigilancia y respuesta, dada la rápida adaptación del suministro ilícito y la diversidad creciente de sustancias involucradas en sobredosis.

Fuente: NDEWS, <https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-268/>

2. Guyana (27 de enero, 2026) - [Nueva] Alerta de Circulación de 3,4 metilenedioximetanfetamina (MDMA)

El SAT de CANU en Guyana reportó por segunda ocasión en un mismo mes la presencia de MDMA en forma de tabletas, tras una operación realizada en Tabatinga, Lethem, donde agentes incautaron una cantidad de pastillas sospechosas de ser éxtasis. Las pruebas iniciales de campo arrojaron la presencia de ETA y las pruebas preliminares posteriores confirmaron que el contenido correspondía a MDMA, clasificado como una sustancia controlada según la legislación nacional.

El SAT de CANU advirtió sobre la circulación actual de tabletas de MDMA en zonas de entretenimiento y alto movimiento comercial en Guyana. Los patrones identificados sugieren que la distribución se vincula a la vida nocturna y al microtráfico dirigido a jóvenes, un hecho de especial relevancia debido a que los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) no son comúnmente hallados en el país. Esta circulación emergente se considera significativa y sugiere una actividad de distribución activa, elevando el nivel de vigilancia requerido.

El consumo de estas tabletas conlleva un riesgo elevado de sobredosis, debido a la variabilidad en la concentración de cada unidad y la posibilidad de adulteración con otras sustancias estimulantes.

Asimismo, el MDMA puede generar efectos psicológicos severos, como paranoia, problemas de memoria, ansiedad, confusión e incluso riesgo de colapso o convulsiones, especialmente cuando se combina con alcohol u otras drogas. Ante estos riesgos, el SAT enfatizó la necesidad de monitoreo constante y acciones preventivas coordinadas entre sectores de seguridad, salud y educación.

Fuente:

<https://www.oas.org/ext/DesktopModules/MVC/OASDnnModules/Views/Item/Download.aspx?type=3&id=985&lang=2>

3. Estados Unidos (23 de enero, 2026) - Alerta de Cambios en el Mercado Ilícito de Fentanilo

El Informe Semanal del NDEWS mostró una evolución reciente en el mercado ilícito del fentanilo, destacando una disminución sostenida de los EMS relacionados con sobredosis no fatales entre 2023 y 2025, así como una reducción proyectada que se extendería hasta finales de 2026. Estos patrones se alinean con evidencia publicada en la Revista Science que sugiere un “shock de oferta” derivado de interrupciones en el acceso a químicos precursores y de un fortalecimiento de los esfuerzos de control, lo que ha repercutido en la disponibilidad y en la pureza del fentanilo reportado en las incautaciones. Paralelamente, el sistema de monitoreo web del NDEWS documentó una caída significativa en la actividad de discusión sobre fentanilo en Reddit, durante los últimos seis meses, un indicador digital que anticipa tendencias epidemiológicas emergentes.

El análisis de las conversaciones en línea reveló que, pese a la disminución general del volumen, persisten preocupaciones relacionadas con prácticas de consumo, riesgos de adulteración y estrategias informales de manejo de la abstinencia. Los usuarios describieron síntomas severos de privación como insomnio, malestar gastrointestinal y deseos intensos de consumir, así como ansiedad ante la posibilidad de exposición accidental a sustancias no opioides. Los foros también expusieron una demanda de herramientas de reducción de daños, como tiras reactivas de fentanilo, junto con dudas frecuentes sobre ventanas de detección en pruebas toxicológicas y diferencias entre formulaciones farmacéuticas y de fentanilo ilícito. Estos elementos sugieren que, aunque la disponibilidad pueda estar disminuyendo, la percepción de riesgo y la vulnerabilidad entre usuarios permanecen elevadas.

Los recientes datos indican reducciones sustanciales en muertes por sobredosis, incluida una caída del 50% entre 2023 y 2024, como una menor presencia de fentanilo en las incautaciones. Al mismo tiempo, estudios de sobredosis en entornos rurales y análisis de mercado subrayan la necesidad de mantener sistemas ágiles de vigilancia ante posibles adaptaciones del suministro ilícito. Estos hallazgos refuerzan la importancia de fortalecer mecanismos de alerta temprana y estrategias regulatorias que puedan anticipar cambios rápidos en la oferta y el consumo de opioides sintéticos.

Fuente: NDEWS, <https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-267-this-weeks-focus-fentanyl-2/>

4. Canadá (21 de enero, 2026) - Alerta por Síndrome de Hiperémesis Cannabinoide (SHC)

El Centro Canadiense de Lucha contra el Abuso de Sustancias (CCSA, por sus siglas en inglés), reportó en enero de 2026 sobre el Síndrome de Hiperémesis Cannabinoide (SHC) y compiló reportes de Health Canada, estudios de Ontario y Alberta y literatura científica revisada por pares, citada en el propio

informe. CCSA describe al SHC como una condición poco reconocida, asociada al uso frecuente y prolongado de cannabis, especialmente de productos con alto contenido de THC, caracterizada por episodios cíclicos de náuseas intensas, vómitos persistentes y dolor abdominal que solo remiten con abstinencia sostenida.

Tras la legalización del cannabis y la fase de comercialización iniciada en 2020, el documento reportó un aumento significativo de las visitas a servicios de urgencias por SHC, con incrementos particularmente marcados en Ontario (trece veces más en 2021 con relación a 2014) y patrones concordantes en Alberta entre personas jóvenes que usan cannabis a diario o casi a diario. El CCSA subrayó que este aumento coincide con la mayor disponibilidad de productos de alta potencia (concentrados, comestibles, bebidas con THC elevado), así como con una mayor sensibilización clínica y la posibilidad de mejor identificación diagnóstica, factores que, en conjunto, contribuyen a la tendencia observada.

Se destacó que el abordaje del SHC requiere un enfoque multifacético de prevención, educación pública, mejor reconocimiento clínico y diagnóstico temprano, acceso a tratamiento para el trastorno por abuso de cannabis y refuerzos regulatorios sobre productos de alta potencia incluidos límites de potencia y advertencias de riesgo en el etiquetado para reducir la carga sobre el sistema sanitario. Asimismo, se advirtió que, aunque ciertos fármacos y medidas como baños calientes o capsaicina tópica pueden aliviar síntomas de manera transitoria, la abstinencia de cannabis sigue siendo la única intervención con capacidad demostrada para lograr la resolución completa del cuadro y reducir las tensiones en el sistema de salud.

Fuente: Centro Canadiense de Lucha contra el Abuso de Sustancias

<https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2026-01/Cannabis-Hyperemesis-Syndrome-Brief-en.pdf>

5. Estados Unidos (16 de enero, 2026) - Alerta de Sobredosis No Fatales por Metadona

El Informe Semanal del NDEWS, a partir de datos de EMS, registró 10.040 encuentros por sobredosis no fatales de opioides que involucraron a la metadona, entre 2023 y 2025, con mayor concentración, a nivel de condados, en estados del sur y del noreste de los Estados Unidos. Paralelamente, el sistema de monitoreo web de NDEWS identificó un aumento en las discusiones sobre el uso de metadona fuera de contextos médicos o supervisados, particularmente en foros de Reddit, donde numerosos usuarios reportan interés en su consumo recreativo y en combinaciones con otros depresores del sistema nervioso central.

La metadona es un agonista opioide de acción prolongada, empleado en tratamientos para Trastorno por Consumo de Opioides (TCO) y para el manejo del dolor. Su acción y capacidad de acumulación aumentan el riesgo de toxicidad, especialmente cuando se combina con benzodicepinas, alcohol u otros medicamentos sedantes. En foros en línea, los usuarios describen intentos de usar metadona para emular efectos de otros opioides, prácticas de auto-deshabitación y un patrón frecuente de policonsumo, así como experiencias de abstinencia prolongada caracterizada por fatiga, alteraciones del sueño y malestar gastrointestinal.

Los hallazgos más recientes también incluyen estudios que muestran riesgo de hipoxia cerebral en personas que abusan de metadona, especialmente cuando se combina con alcohol, así como evidencia de que políticas regulatorias, como la eliminación de tabletas de 40 mg en 2008, han evitado cientos de muertes por sobredosis. Revisiones estatales de incidentes mortales en entornos correccionales subrayan fallas en los protocolos de inducción de metadona para personas sin tolerancia a opioides,

destacando la necesidad de fortalecer prácticas clínicas, supervisión médica y estrategias de reducción de daños.

Fuente: NDEWS, <https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-266-this-weeks-focus-methadone/>

6. Guyana (15 de enero, 2026) - Alerta de Circulación de Dispositivos Vapeadores con THC

El SAT de CANU en Guyana reportó la presencia de cartuchos de vapeo que contienen extracto de cannabis, importados ilegalmente y comercializados en empaques coloridos y con marcas comerciales. La incautación tuvo lugar durante una operación en el área de Campbellville Housing Scheme, Georgetown, donde los agentes decomisaron múltiples dispositivos de vapeo con apariencia profesional y dirigidos potencialmente a los jóvenes. La composición química de estos productos aún es desconocida y se encuentra pendiente de análisis por parte del Laboratorio de Ciencia Forense de Guyana, lo que incrementa la preocupación sobre su verdadera naturaleza y potencia.

Las autoridades de CANU advirtieron que estos cartuchos, no autorizados para su importación o venta en Guyana, podrían contener sustancias peligrosas como THC de alta concentración, cannabinoides sintéticos y otros contaminantes asociados con lesiones pulmonares. El empaque presenta elementos como códigos QR, hologramas y referencias de uso médico, lo que sugiere una estrategia para legitimar su circulación y facilitar su introducción al mercado local. Los patrones detectados también indican rutas de entrada mediante envíos por mensajería, equipaje personal o carga aérea, lo que evidencia una modalidad de tráfico coordinado.

El SAT de CANU alertó sobre la posibilidad de una expansión en la circulación de estos productos, especialmente entre adolescentes y jóvenes, dada su presentación atractiva y la facilidad de transporte. La ausencia de regulación y la composición química todavía desconocida elevan el riesgo de efectos adversos para la salud, incluidos daños pulmonares, intoxicaciones severas y riesgos psiquiátricos como pánico o alucinaciones. Ante este escenario, las autoridades recomendaron aumentar las medidas de control, alertar a centros de salud y reforzar las campañas preventivas en instituciones educativas para mitigar la propagación y el consumo de estos dispositivos.

Fuente: Customs Anti Narcotic Unit, Guyana National Drug Authority, <https://canu.gov.gy/cannabis-vape-cartridges-discovered-issues-national-early-warning-alert/>

7. Estados Unidos (9 de enero, 2026) - Alerta de Consumo no Médico de Buprenorfina

El Informe Semanal del NDEWS, a partir de datos de los EMS, identificó 2.510 casos de sobredosis no fatales relacionadas con buprenorfina, entre principios de 2023 y finales de 2025. Además, monitoreos en línea revelaron publicaciones en la red social Reddit, donde numerosos usuarios mencionaron el uso de buprenorfina sin supervisión médica.

La Buprenorfina (coloquialmente llamada “Bupe” por algunos usuarios) es un agonista parcial de los receptores mu-opioides, de acción prolongada. Se utiliza principalmente en el tratamiento del TCO y en ciertas condiciones de dolor. El medicamento está disponible en diversas presentaciones, como tabletas sublinguales, parches transdérmicos, soluciones orales y formulaciones inyectables. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado su

uso debido a su eficacia para reducir el consumo, así como para disminuir la mortalidad asociada a los opioides.

Los reportes de los EMS, concentrados en estados del sur de los Estados Unidos, señalan un incremento en el consumo no prescrito de esta sustancia. Paralelamente, monitoreos web del NDEWS en Reddit descubrieron menciones de vías de administración no médicas, como la inhalación de comprimidos sublinguales o la inyección de sustancias disueltas, descritas como métodos para lograr un inicio de acción más rápido o efectos más intensos. Los usuarios que consumen buprenorfina sin indicación médica han reportado efectos adversos que incluyen náuseas severas, estados mentales disfóricos y síntomas similares a la sobredosis, especialmente cuando se combina con otros depresores del sistema nervioso central (SNC).

Fuente: NDEWS, <https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-265>

8. Guyana (3 de enero, 2026) - Alerta de Circulación de 3,4 metilenedioximetanfetamina (MDMA)

El SAT de CANU en Guyana, reportó la detección de MDMA en forma de tabletas tras la interceptación de un vehículo por agentes de CANU. Durante la operación, se incautaron tres contenedores plásticos que ocultaban fundas tipo ZipLock. Dentro de estos compartimentos se encontraron tabletas presuntamente de éxtasis. El Laboratorio de Ciencia Forense de Guyana confirmó que las sustancias interceptadas dieron positivo para MDMA.

El SAT de CANU advirtió sobre la circulación actual de tabletas de MDMA en zonas de alto comercio y entretenimiento en Guyana. Los patrones de distribución vinculan estas sustancias con la vida nocturna y el microtráfico entre poblaciones jóvenes.

Fuente: Customs Anti Narcotic Unit, Guyana National Drug Authority, <https://cdc.gy/ews/>
<https://www.oas.org/ext/es/principal/oea/nuestra-estructura/sq/ssm/cicad/observatorio-interamericano-drogas/sata-documentos-paises/pais/id/726>

9. Argentina (No 9 – noviembre, 2025) - Alerta sobre N-etilpentilona en Comprimidos

El SAT Nacional de Argentina, tras una notificación proveniente de la División de Narcotráfico del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, informó sobre la incautación de comprimidos de la catinona sintética N-etilpentilona.

La detección siguió con una operación que confiscó aproximadamente 100 tabletas con composiciones diversas, incluyendo MDMA y MDA. Este hecho marca la primera identificación de N-etilpentilona en Córdoba, vinculada al consumo en población universitaria y al riesgo de comercialización engañosa como si se tratara de éxtasis, lo que podría causar su exposición involuntaria.

La N-etilpentilona (también conocida como efilona o bk-EBDP) carece de uso medicinal reconocido y figura entre las cinco catinonas sintéticas más reportadas a nivel global. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la recaptación de dopamina y noradrenalina, con efectos estimulantes significativos. Los comprimidos suelen administrarse por vía oral, nasal o intravenosa y se asocian a efectos adversos graves: taquicardia, hipertermia, insuficiencia renal, así como alteraciones psicológicas como psicosis,

paranoia y alucinaciones. No existen antídotos específicos, por lo que el tratamiento es únicamente sintomático. En Argentina, la sustancia está fiscalizada como “estupefaciente” bajo el Decreto N° 1130/2024.

El SAT advirtió que la circulación de N-etilpentilona incrementa los riesgos sanitarios y sociales, dado su alto potencial adictivo y la evidencia de intoxicaciones fatales en otros países. La variabilidad en la composición de las tabletas y la posibilidad de adulteración con otras drogas sintéticas, aumentan la probabilidad de sobredosis y complicaciones severas. Se recomendó a las autoridades internacionales y organismos de cooperación reforzar los SAT, monitorear patrones de distribución en entornos juveniles y promover campañas preventivas para reducir el impacto de estas sustancias emergentes en la región.

Fuente: Sistema de Alerta Temprana de Argentina, <https://www.argentina.gob.ar/sat/alertas>

10. Argentina (No 8 – noviembre, 2025) - Alerta de Policonsumo de Sustancias Psicoactivas

El SAT Nacional de Argentina, con apoyo técnico del Programa DROSINAR de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), notificó en noviembre de 2025 la detección de un caso de policonsumo de alto riesgo en la provincia de Mendoza. El análisis forense de muestras biológicas reveló la presencia simultánea de N-Metil-2-aminoindano, metcatinona, cocaína, cafeína, metilfenidato, gabapentina y nordiacepam, así como metabolitos asociados (como benzoilecgonina, cocaetileno y ácido ritalínico). El descubrimiento refleja nuevos patrones de consumo que combinan estimulantes, depresores y sustancias de uso terapéutico.

Las autoridades sanitarias y de seguridad advirtieron que varias de estas sustancias carecen de uso médico reconocido y están fiscalizadas como estupefacientes en Argentina, mientras que otras, como el metilfenidato y la gabapentina, son medicamentos regulados. El consumo combinado incrementa riesgos cardiovasculares, neurológicos y psiquiátricos, incluyendo taquicardia, hipertensión grave, psicosis, convulsiones y potencial de dependencia. La interacción cocaína-alcohol, que produce cocaetileno, potencia la toxicidad y eleva la probabilidad de eventos clínicos severos.

El SAT subrayó que este tipo de policonsumo representa una amenaza significativa para la salud pública y requiere atención prioritaria. Se recomendó fortalecer la cooperación internacional en monitoreo, intercambio de información y estrategias preventivas, dado que la evidencia indica un aumento en la circulación de NSP y patrones complejos de consumo en la región.

Fuente: Sistema de Alerta Temprana de Argentina, <https://www.argentina.gob.ar/sat/alertas>